

ลำดับ	วิธีปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
9	ไม่สอดเข็มเข้าไปในบล็อกใส่เข็มอีก ภายหลังการใส่เข็มเข้าไปในหลอดเลือดแล้ว ควรทิ้งไว้ในที่ทิ้งของมีคม			
10	เขียนป้ายติดไว้ที่ขวดสารน้ำทุกขวดและติดสติ๊กเกอร์สีที่ชุดของสารน้ำและตำแหน่งที่ให้สารน้ำ เพื่อให้ทราบว่เริ่มให้วันที่เท่าไร และเวลาอะไร เพื่อกำหนดวันและเวลาที่เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ และตำแหน่งที่ให้สารน้ำ			
11	ล้างมือแบบ Hygienic hand washing ภายหลังการแทงสายสวนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ			
12	อธิบายวิธีการดูแลและความผิดปกติให้ผู้ป่วยทราบ			
การดูแลสายสวนหลอดเลือดดำ				
1	ตรวจดูบริเวณที่แทงเข็ม ถ้ามีรอยแดงหรือบวม เปลี่ยนตำแหน่งที่แทงเข็มใหม่			
2	เปลี่ยนพลาสเตอร์ปราศจากเชื้อที่ปิดทับบริเวณที่แทงเข็มเมื่อซึมเปื้อน/หลุด			
3	เปลี่ยนสารน้ำที่ให้ทุก 24 ชั่วโมง ถ้าเป็นไขมันให้เปลี่ยนภายใน 12 ชั่วโมง			
4	เปลี่ยนชุดให้สารน้ำทุก 96 ชั่วโมง ถ้าเป็นระบบปิด กรณีที่ไม่เป็นระบบปิดเปลี่ยนชุดให้สารน้ำภายใน 24 ชั่วโมง กรณี Injection Plug ให้เปลี่ยนภายใน 96 ชั่วโมง			
5	ติดสัญลักษณ์แถบสีแสดงวันหมดอายุของชุดให้สารน้ำบริเวณกระเปาะ			
6	ชุดให้สารน้ำเมื่อให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดจะต้องทิ้งไป ไม่นำมาใช้ให้สารน้ำอื่นต่อ			
7	ไม่ดูดเลือดไปตรวจจากหลอดเลือดที่ให้สารน้ำ			
8	หยุดการให้สารน้ำนั้นทันที ถ้าพบผู้ป่วยมีอาการใช้ หนาวสั่น			
สรุป	ปฏิบัติ.....ข้อ คิดเป็น.....% ไม่ปฏิบัติ.....ข้อ คิดเป็น.....%			

เอกสารอ้างอิง:สมหวัง ด้านชัยวิจิตร.(2548).วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล.(หน้า79-85).กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อักษรสมัย.

:อะเคือ อุณหเลขกะ.(2549).Infection Control:Basic Concept And Training(Second Edition).Thai version.(หน้า 82-90).เชียงใหม่:โรงพิมพ์เมือง

:Quick Summary:2002 CDC-HICPAC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infection