

แบบส่งต่อผู้ป่วย severe sepsis / septic shock จังหวัดชลบุรี

ชื่อ สกุล.....อายุ..... เพศ.....HN.....โรงพยาบาล.....

T.....°C P...../min RR...../min BPmmHg (MAP.....mmHg)

ส่งตัวออกจาก ☐ ward (admit วันที่.....) ☐ ER

วันที่ส่งต่อ.....เวลา.....

ตำแหน่งติดเชื้อ (จากประวัติ/ตรวจร่างกาย) ☐ ทางเดินหายใจ ☐ ทางเดินปัสสาวะ ☐ ระบบประสาท ☐ ผิวหนัง / กล้ามเนื้อ ☐ ทางเดินอาหาร ☐ อื่นๆ..... ☐ ไม่แน่ใจ ☐ ไม่มี	+	ประเมินอาการดังต่อไปนี้ ☐ ช็อค ☐ SBP $\leq$ 100mmHg ☐ RR $\geq$ 22/min
---	---	--

มี 2 หรือ 3 ข้อ

↓

0 หรือ 1 ข้อ

↘

รักษาตามปกติ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้	หมายเหตุ
☐ Take hemoculture * 2 ชุด (เอาขูดมาแลกที่ ER)	
☐ Stat antibiotic ชนิด/ขนาด.....	
☐ MAP < 70mmHg (ให้เริ่ม NSS load) NSS load ภายใน 1 ชั่วโมง ☐ 1500ml สำหรับ อายุ > 60ปี หรือ มีโรคหัวใจ หรือ โรคไต ☐ 3000ml สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ☐cc	
☐ ใส่สายสวนปัสสาวะ Urine output หลัง load fluid.....	
☐ ตรวจ blood lactate (ถ้าตรวจได้) ผล.....	
ให้ vasopressor ☐ dopamine ☐ levophed ☐ adrenaline	
ข้อมูลก่อนส่งต่อ BP.....mmHg total IV fluid ก่อนส่งตัว.....ml	

*****กรุณาใช้ใบคัดกรองในการประเมินมาพร้อมกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกรายที่ส่งต่อ โรงพยาบาล ชลบุรี*****

นำใบส่งต่อ ส่งที่กล่องที่ เวอร์เปด หน้า ER