

โรงพยาบาลสตึก กม.10 จ.ชลบุรี	Standing Order	ชื่อ
	Sepsis / Septic shock	อายุ.....ปี Ward..... HN AN

Early detection
 site infection + quick SOFA positive 2 ใน 3 ข้อ ☐ ซึม ☐ SBP $\leq$ 100mmHg ☐ RR $\geq$ 22/min
 site infection + SIRS ($\geq$ 2 ใน 4 ข้อ) ☐ Temp $> 38^{\circ}\text{C}$ or $< 36^{\circ}\text{C}$ ☐ HR $> 90/\text{min}$
☐ RR $> 20/\text{min}$ or PaCO₂ < 32 mmHg ☐ WBC $> 12,000/\text{mm}^3$ or $< 4,000/\text{mm}^3$ or band form PMN $> 10\%$
First Diagnosis ☐ Sepsis ☐ Severe Sepsis ☐ Septic shock

ตำแหน่งที่สงสัย Infection
☐ Respiratory ☐ GI ☐ Soft tissue ☐ GU
☐ CNS ☐ Cardiovascular ☐ Tropical infection ☐ other.....

Order for one day	วันที่/ เวลา	Order for Continuation
☐ Admit ward..... ☐ CBC, H/C 2 ชุด พร้อมกันจากแขนข้างละ 1 specimen ☐ U/A, U/C ☐ CXR ☐ Malaria, Lepto, Melioid titer ☐ BS, BUN, Cr, E'lyte, AST, ALT ☐ เพิ่ม lab ** ให้ยา ATB ภายใน 1 ชม. หลังทำ H/C ☐ Antibiotic stat dose (กรณีผู้ป่วยเคยได้รับ ATB มาก่อน) ☐ Ceftazidime 2 gm+NSS 100 ml iv drip stat then..... ☐ Amikin 750 mg+NSS 100 ml iv drip stat then..... (ปรับตาม CrCl) ☐ กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับ ATB มาก่อน ☐ Ceftriaxone 2 gm+NSS 100 ml iv drip stat ☐ Retain Foley's catheter ☐ Fluid resuscitation (กรณี severe sepsis/ septic shock) ** ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ให้อย่างน้อย 3,000 ml ใน 1 ชม. แรก ☐ NSS 1000 ml IV load in 30 min then rate 500 ml/hr xชั่วโมง ** ผู้ป่วยสูงอายุ/ มีโรคหัวใจ หรือโรคไต หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิด volume overload ให้อย่างน้อย 1,500 ml ใน 1 ชม. แรก ☐ NSS 500 ml IV load in 30 min then rate 200 ml/hr xชั่วโมง ☐ Dopamine 100 mg + 5% D/W 100 ml (1:1 start 15 cc/hr) max dose 60 cc/hr (keep MAP $\geq$ 65 mmHg) ☐ Norepinephrine (1:25) iv drip start..... Max dose..... ☐ O ₂ sat $< 92\%$ หรือ RR $> 30/\text{min}$ พิจารณา Intubate + Respiratory support + Refer		☐ Soft diet ☐ Regular diet ☐ NPO ☐ Record V/S ☐ Record I/O cc keep urine output > 0.5 cc/kg/hr ☐ เช็ดตัวลดไข้บ่อยๆ ☐ DTx bid, ac ☐ ถ้า SOS score ≥ 4 pls notify แพทย์ ☐ O ₂ cannula 4 LPM keep O ₂ Sat $> 95\%$ <u>Medication</u> ☐ Para (500 mg) 1 tab ☒ pm q 4-6 hr ☐ Ceftriaxone 2 gm IV OD ☐ Ceftazidime 2 gm IV q 8 hr ☐ Losec (20 mg) 1 x 1 ☒ ac ☐ ☐ ☐

