

แบบประเมินผู้ป่วย sepsis 2018 แกร็บ

จุดคัดกรอง

เวลา.....น.

วันที่.....

HN.....

qSOFA ประเมินจาก ☐ ชีพ ☐ RR ≥ 22 ☐ SBP ≤ 100 (BP/....., MAP.....)

คะแนนรวม ☐ 2, 3 (qSOFA + ve) ☐ 0 หรือ 1

ผู้ประเมิน.....☐ RN

☐ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ถ้าไม่ได้ส่งผู้ป่วยเข้า ER ให้เก็บไปส่ง ICN

ER

เวลา..... qSOFA ประเมินจาก ☐ ชีพ ☐ RR ≥ 22 ☐ SBP ≤ 100

qSOFA score -> 2 หรือ 3 + infection

Sepsis

Septic Shock

เริ่ม Standing order เวลา.....น. ที่หน่วยงาน

☐ H/C x 2 specimens ทำที่ ☐ รพช. ☐ ER

☐ Blood lactate (หากทำได้) ทำที่ ☐ รพช. ☐ ER

☐ ประวัติ Antibiotics ที่เคยได้รับก่อนหน้า 3 เดือน

ระบุ.....

☐ Antibiotics ที่ให้ครั้งนี้ ระบุ

ทำที่ ☐ รพช. ☐ ER

☐ If MAP < 70 mmHg or Lactate > 4 และไม่สงสัยภาวะ volume overload

IV fluid ☐ NSS ☐ Ringer's lactate solution ทำที่ ☐ รพช.

☐ ER

☐ 1500 ml ใน 60 นาที

หรือ ☐ 1000 ml ใน 60 นาทีแรก จากนั้น 500 ml ใน 60 นาทีต่อไป

หรือ ☐ 500 ml ใน 60 นาทีแรก ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

At ward..... เวลา.....น.

qSOFA score -> 2 หรือ 3 + infection

แพทย์ประเมินการรักษา

ตำแหน่งการติดเชื้อ.....

ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำเกิน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

มีข้อบ่งชี้การจ้อง ICU ☐ มี ☐ ไม่มี

เป็นผู้ป่วย respiratory failure

ยินยอมรับการรักษา/ ทำหัตถการ

ไม่ใช่ end stage malignancy หรือ case NR

แพทย์ผู้ประเมิน

ประเมิน sepsis bundle

☐ H/C x 2 sp ☐ ทำมาแล้วที่ รพช./ ER ☐ ทำที่ ward

☐ Antibiotic stat ☐ ทำมาแล้วที่ รพช./ ER ☐ ทำที่ ward

☐ Blood lactate แกร็บ (เจาะที่ รพช. หรือ ER) =.....

☐ 0.9% NSS ให้จนครบ 1500 ml เวลาที่คาดว่าจะครบ น.

☐ ที่ 6 ชั่วโมง blood lactate = (ถ้า > 4 แจ้งแพทย์ประเมินใหม่)

☐ ที่ 6 ชั่วโมง MAP = (ถ้า < 70 mmHg แจ้งแพทย์ประเมินใหม่)

พยาบาลผู้ดูแลRN