

แนวปฏิบัติการประเมินสภาพผู้ป่วย โดยใช้ SOS score (Search Out Severity Score)

score	3	2	1	0	1	2	3
อุณหภูมิ		≤35	35.1-36	36.1-38	38.1-38.4	≥38.5	
ความดันโลหิต (systolic)	≤80	81-90	91-100	101-180	181-199	≥200	ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต
ชีพจร	≤40		41-50	51-100	100-120	121-139	≥140
หายใจ	≤8	ใส่เครื่องช่วยหายใจ		9-20	21-25	26-35	≥35
ความรู้สึกตัว			สับสน กระสับกระส่าย ที่เพิ่งเกิดขึ้น	ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง	ซึม แต่ เรียกแล้วลืมตา	ซึมมาก ต้องกระตุ้น ถึงจะลืมตา	ไม่รู้สีกตัว แม้จะกระตุ้น แล้วก็ลืมตา
ปัสสาวะ / วัน		≤500	501-999	≥1000			
ปัสสาวะ / 8 ชม.		≤160	161-319	≥320			
ปัสสาวะ / 4 ชม.		≤80	81-159	≥160			
ปัสสาวะ / 1 ชม.		≤20	21-39	≥40			

