

แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วย Sepsis รพ.สต.หีบ กม.10

วินิจฉัย (สาเหตุของ sepsis)วันที่.....เวลาที่เริ่ม sepsis careน.

[illegible]

ภายใน 6 ชั่วโมง ผู้ป่วย sepsis ควรได้รับการดูแล ดังนี้

1. MAP $\geq$ 65 mmHg
2. Urine output $\geq$ 0.5 mL/kg/hr
3. Keep Hct $\geq$ 30%
4. Dobutamine to max 20 μ g/kg/min
5. Keep DTx 80-180 mg/dl
6. ให้ hydrocortisone $\leq$ 200 mg/day (ถ้าตอบสนองไม่ดีต่อการให้ volume หรือ มีความเสี่ยงต่อการเกิด adrenal insufficiency)
7. กรณีเป็น Septic shock ส่งต่อ รพ.ชลบุรี

Severe sepsis

Infection + MAP < 70 mmHg

หรือ organ involvement (ซึม, ปัสสาวะออกน้อยกว่า
0.5 ml/kg/hr, respiratory failure, ect.)

หรือ qSOFA positive 2 ใน 3 ข้อ

- 1) ซึม, สับสน
- 2) sBP $\leq$ 100mmHg
- 3) RR $\geq$ 22/min

หรือ $SOS \geq 4$

Septic Shock

Infection + MAP $\leq$ 65 mmHg

หรือ blood lactate > 2 mmol/dl

หลัง load IV fluid