


**แนวทางปฏิบัติ เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุจาก เข็ม ของมีคมหรือสัมผัส
สารคัดหลั่ง ขณะปฏิบัติงาน รพ.สต.ทึบ กม.10**



ในเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ

- 1.แจ้งหัวหน้างานทันที บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในแบบฟอร์ม
- 2.Counseling ผู้ป่วย เพื่อขอเจาะเลือดตรวจ AntiHIV, HbsAg,AntiHBs,AntiHCV และขอผลด่วน
- 3.พบพยาบาลให้คำปรึกษา ที่คลินิกพิเศษ เพื่อ
 - 3.1 ส่งเจาะเลือดที่ห้องlab เพื่อตรวจ AntiHIV, HbsAg,AntiHBs,AntiHCV,BUN,Cr.,CBC
 - 3.2 รับคำปรึกษาถึงความเสี่ยง และตัดสินใจทานยา
- 4.พบแพทย์
- 5.รับยาARV stat dose ที่ห้องยาภายใน 72ชม.หลังเกิด

- 1.แจ้งหัวหน้าเวรทันที บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในแบบฟอร์ม
- 2.Counseling ผู้ป่วย เพื่อขอเจาะเลือดตรวจ AntiHIV, HbsAg,AntiHBs,AntiHCV และขอผลด่วน
- 3.ประสานงานกับเวรตรวจการณพยาบาลเพื่อ
 - 3.1 ส่งเจาะเลือดส่งตรวจผ่านER เพื่อตรวจ AntiHIV, HbsAg,AntiHBs,AntiHCV,BUN,Cr.,CBC
 - 3.2 พบแพทย์/รับยา ARV (คำนวณdoseโดยแพทย์ เวรจนถึงวันราชการ)
- 4.พบพยาบาล ที่คลินิกพิเศษ ในวันราชการถัดไป

สมัครใจรับประทานยา

ไม่สมัครใจรับประทานยา

สูตรยาแนะนำ


1. TRUVADA(TDF+FTC) 1*1 + Rilpivirine(25mg) 1*1
พร้อมอาหาร
 2. TRUVADA(TDF+FTC) 1*1 + LPV/r (200/50mg) 2*2
 3. TEEVIR(TDF+FTC+EFV) 1*1
- ถ้า CrCl<60 ใช้ AZT 300 1*2 แทนTDF**

ICNสรุปข้อมูลอุบัติการณ์ และผลการรักษา
ภายใน 1 สัปดาห์ และนำเสนอต่อICC

หมายเหตุ หัวหน้างาน/พยาบาลจุดปฏิบัติงาน แจ้งอุบัติการณ์ ICN ภายใน 24ชั่วโมง
ถ้าเกิน72ชม. การรับประทานยา จะไม่มีผลต่อการป้องกัน

ปรับปรุงเมื่อ เมษายน 2560

แผนภูมิที่ 7.1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน



Lab post exposure to HIV (เข็มตำ, ถูกเข็มขึ้น, etc.)

ผู้ถูกกระทำ Anti HIV – Baseline / 1 เดือน / 3 เดือน

CBC, Cr, ALT – Baseline

HBsAg – Baseline / 3 เดือน

Anti HBs – Baseline

Anti HCV – Baseline, 3 เดือน

Source Anti HIV- ทันที

HBs Ag – ทันที

Anti HCV -ทันที

ถ้า Source AntiHCV Positive ให้ผู้ถูกกระทำตรวจ Anti HIV ซ้ำที่ 6 เดือน

สูตรยา

แนะนำ 1. TRUVADA(TDF+ FTC) 1*1 +Rilpivirine 25 1*1

พร้อมอาหาร

2. TRUVADA (TDF+FTC) 1*1 +LPV/r 200/50 2*2

3. TEEVIR (TDF+FTC+EFV) 1*1

CrCl < 60 ใช้ AZT 300 1*2 แทน TDF

ห้ามทาน ergotamine derivative ขณะทาน LPV/r หรือ EFV → Severe Vasoconstriction → Blue Limb