

แบบติดตามยาความเสี่ยงสูง: Magnesium sulfate injection (10%, 50ml & 50%, 10 ml)

ข้อบ่งใช้ MgSO₄ inj. ☐ hypoMg ☐ Eclampsia/pre-eclampsia ☐ Torsades de pointes

ขนาดยา MgSO₄ inj. ที่ได้รับ.....

อาการและผลการตรวจปฏิบัติการ ที่ต้องเฝ้าระวัง	เวลา						
	0 นาที	15 นาที	30 นาที	1 ชม.	2 ชม.	3 ชม.	4 ชม.
1. HR Arrhythmia (HR > 100 beats/min)***							
2. RR*** (อัตราการหายใจ ต่ำกว่า 14 ครั้ง/นาที)							
	0 นาที	4 ชม.	8 ชม.	12 ชม.	16 ชม.	18 ชม.	24 ชม.
1. HR Arrhythmia (HR > 100 beats/min)***							
2. RR*** (อัตราการหายใจ ต่ำกว่า 14 ครั้ง/นาที)							
3. กัดการทำงานของ reflexes ทดสอบโดย knee jerk reflex ทุก 4 ชั่วโมง ถ้า negative ให้ทำ bicep jerk reflex ถ้า negative ให้รายงาน แพทย์เพื่อพิจารณาหยุดยา							
4. Urine output ควรมากกว่า 100 mL/ 4 hr หรือไม่ต่ำกว่าวันละ 600 mL							
5. ความร้อนในร่างกายต่ำผิดปกติ (hypothermia T < 37 องศาเซลเซียส)							
6. ความดันโลหิตต่ำ (BP< 90/60 mmHg)***							
7. หน้าแดง							
8. เหงื่อออก							
ลงชื่อพยาบาลผู้ฉีด/ประเมินอาการข้างเคียง							

*** ผลข้างเคียงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย	อายุ	น้ำหนัก กก.	HN	AN	แพทย์
------------------	------	----------------	----	----	-------