

High Alert Drug Pethidine injection

Notify if : 1. RR < 12 ครั้ง/ นาที
2. BP < 90/60 mmHg
3. มีอาการแสดงพิษจาก pethidine ได้แก่ ซึม ปลุกไม่ตื่น สั่น กล้ามเนื้อกระตุก ชัก รุนานตาหด

Slow IV push: ติดตาม ทุก 5 นาที 4 ครั้ง และทุก 30 นาที 2 ครั้ง

IM/SC: ติดตาม ทุก 15 นาที ในช่วง 1 ชั่วโมงแรก และทุก 30 นาที 2 ครั้ง

แนวทางการเตรียมและบริหารยา

1. ตรวจสอบยาก่อนเตรียม
คำนวณยา และการผสมยา โดย
พยาบาล 2 คน

2. ผสมยาสำหรับให้ทาง IV
โดยใช้สัดส่วน ดังนี้

pethidine 50 mg/ ml ปริมาตร 1 ml +
SWFI หรือ NSS หรือ D5W 4 ml

↓
ได้เป็น pethidine ความเข้มข้น
10 mg/ ml

3. ไม่ผสม pethidine กับยา
อื่น

4. ก่อนให้ยาตรวจสอบวิธีทางให้
ยาซ้ำอีกครั้ง

5. ระหว่างให้ยา pethidine ควร
ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอน และป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม

6. การให้ยาแบบ IV ต้องเจือจาง
ก่อนใช้ ใช้เวลาในการให้ยา > 5 นาที

วันที่	เวลา	RR (ครั้ง/นาที)	BP (mmHg)	Notify และการแก้ไข	ลงชื่อ พยาบาล
Baseline					

ชื่อ-นามสกุล _____ HN _____ วันที่ _____