

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาษวานร(MPOX)

จุดคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจร่างกาย

ใช้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อม้ำเหลืองบวมโตหรือมีผื่นตุ่มที่ผิวหนัง

๑.มีอาการตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค
๒.ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคฝีดาษวานร

สงสัยติดเชื้อ

ไม่

รักษาตามสาเหตุของโรค

ใช่

ระหว่างรอ

- ๑.แยกผู้ป่วยระยะห่างมากกว่า ๑ เมตร/จัดเข้าห้องแยก(ER)
- ๒.จัดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ๓.ใช้ผ้าห่มคลุมตัวให้มิดชิด

- พักห้องแยกโรคเดี่ยว ประตูปิดสนิท
- กิจกรรม aerosol ควรใช้ห้องNegative

- ผู้ป่วย สวมหน้ากากอนามัยและสวมเสื้อผ้าปกคลุมรอยโรค
- กรณีเคลื่อนย้ายใช้ผ้าคลุมตัวให้มิดชิด

OPD: จุจรรอ contact precautions : **Fast tact**

IPD: รับเป็นผู้ป่วยใน ห้องแยก/ใส่หน้ากากปิดม่าน (กรณีไม่มีห้องแยก)

- บุคลากรสวมPPE ตามกิจกรรมความเสี่ยง
- ใช้หลักstandard precautions + contact precautions + airborne precautions
- แยกของใช้ในห้องเฉพาะราย
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมทำให้ฟุ้งกระจายจากสะเก็ดรอยโรคเช่นพัดลมสาย กวาดปัดถู
- ขยะ ผ้าเปื้อนจากผู้ป่วย แยกเป็นติดเชื้อ

- เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อตามแนวทางกรมวิทย์