

โคเคน สารเสพติดจากธรรมชาติ

โคเคนเป็นสารเสพติดได้มาจากสารกระตุ้นโคคา (Coca) จัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 2 มีชื่อเรียกมากมายในกลุ่มผู้เสพ เช่น แคร็ก (Crack) ใก๊ก (Coke) ฯลฯ วิธีเสพ ใช้กินเป็นใบ หรือ ใช้โคเคนที่สกัดเป็นผงเสพได้โดยการสูดเข้าทางจมูก, สูบ หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

การออกฤทธิ์ และพิษภัย

การเสพมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทที่สมองส่วนกลางทำให้เส้นโลหิตส่วนปลายหดเกร็งตัว ทำให้หลอดเลือดตีบ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นแรง เลือดไปเลี้ยงเนื้อหัวใจตาย ถ้าเสพเข้าโดยการสูดดมเป็นเวลานาน ผนังจมูกจะเกิดเนื้องอกเป็นรูโหว่ได้ และเป็นโรคปอดระยะยาว ไอเรื้อรัง ปวดบวมโดยไม่มีเชื้อโรค เมื่อใช้เสพในขนาดสูงจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ การเสพต่อเนื่องเป็นเวลานานมีผลต่อจิตประสาท ชึมเศร้า ประสาทหลอน หวาดกลัว ในหญิงมีครรภ์ที่ติดโคเคนเด็กจะพิการตั้งแต่ยังไม่คลอด แท้งก่อนคลอด หรือถ้าคลอดแล้วจะเป็นเด็กปัญญาอ่อน

รู้ระวังภัยยาเสพติด ชีวิตไม่เป็นทาส

♥ ศึกษาหาความรู้โทษภัยยาเสพติด

♥ ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด

♥ หลีกเลี่ยงเพื่อนที่จะนำพาไปใช้ยาเสพติด

♥ ก่อนใช้ยาเสพติดต้องปรึกษาแพทย์

♥ ไม่แก้ปัญหา หรือหาทางออกด้วยยาเสพติด

♥ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



แหล่งให้ความช่วยเหลือ

สายด่วนยาเสพติด 1165 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตลอด 24 ชั่วโมง



โรงพยาบาลสตึก กม.10	038-245051 ต่อ 1074
โรงพยาบาลชลบุรี	038-931600-1
โรงพยาบาลบางละมุง	038-429244
	038-411551-2 ต่อ 211
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม	038-343601 ต่อ 207
โรงพยาบาลพนัสนิคม	038-460333 ต่อ 4507-8
โรงพยาบาลพานทอง	038-932548-9
โรงพยาบาลบ้านบึง	038-442200 ต่อ 221
โรงพยาบาลแหลมฉบัง	038-351010-12
	038-352974-79 ต่อ 1135
โรงพยาบาลหนองใหญ่	038-219310 ต่อ 132
โรงพยาบาลเกาะสีชัง	038-216100 ต่อ 105
โรงพยาบาลบ่อทอง	038-211288 ต่อ 131
โรงพยาบาลเกาะจันทร์	038-166300 ต่อ 225
	038-195703

หรือติดต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง



สารเสพติด ออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท



โรงพยาบาลสตึก กม.10

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

โทร 038-245051

ยาเสพติด ภัยของเยาวชน

ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ ยาเค โคเคน ยาเสพติด กลุ่มดังกล่าวเป็นยาเสพติดที่มีโทษต่อร่างกาย จิตใจ และสมองของเยาวชน ในปัจจุบันมักใช้เพื่อเข้าสังคม ความสนุกสนาน คลายความเครียด มีผลเป็นที่พึงพอใจ ต้องเพิ่มขนาดการเสพจนกระทั่งเข้าสู่ระบบของการเสพติดทั้งกายและจิตใจ



ยาบ้า อันตรายต่อตนเองและสังคมชาติ

ยาบ้า หรือ แอมเฟตามีน (Amphetamine) อาจมีชื่อเรียกในกลุ่มผู้เสพยามากมาย เช่น ยาชยัน เขียวอมรกต ฯลฯ นิยมเสพโดยการสูดดม มีโทษทางกฎหมายตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 พ.ศ. 2522

การออกฤทธิ์ และพิษภัย

เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่สมอง ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของสมองให้ทำงานเพิ่มมากขึ้น ขับสารสื่อประสาทประเภท เดมี คือ โดปามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นสื่อที่ทำให้มีความรู้สึกเป็นสุขเบิกบาน กระตุ้นกระชวย มีแรงขยันขันแข็ง และในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจะมีผลทำให้ผู้เสพยามีอาการทางจิต และประสาท การเสพยาบ้าก่อให้เกิดพิษเฉียบพลัน เช่น แรงการทำงานของหัวใจเพิ่มมากขึ้น หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง เลือดไหลเวียนในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ เมื่อเสพยาบ้าเป็นประจำในปริมาณมาก และต่อเนื่องในระยะเวลาติดต่อกัน มีผลให้เป็นโรคสมองติดยา เกิดการทำลายสมองส่วนบนด้านความคิด ความจำเสื่อม ทำให้ผู้เสพยาบ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คิดถึงการติดยาเสพติดตลอดเวลา หลุดหลุดง่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ผลสุดท้ายจะเป็นโรคจิตเต็มขั้นและสติฟั่นเฟือนในที่สุด

ยาไอซ์ ยาเลิฟ มหันตภัยยุคใหม่

ยาไอซ์ ยาเลิฟ (MDMA และ MDA) บางครั้งจะถูกเรียก รวมกัน หรือแทนกัน แต่อันที่จริงเป็นยาคนละตัว แต่ออกฤทธิ์คล้ายกัน ยาไอซ์ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทคล้าย Amphetamine แต่ออกฤทธิ์แรงกว่า 10 เท่า ขณะเดียวกันก็ออกฤทธิ์หลอนประสาทด้วย มีอันตรายมากไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ นับเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ลักษณะยาไอซ์ ยาเลิฟ มีหลายรูปแบบ เช่น เป็นเม็ด เป็นผลึกสีขาว คล้ายน้ำแข็ง Crystallized form หรือที่เรียกว่ายาไอซ์ (Ice) เมื่อถูกความร้อนจะหลอมละลายได้ง่ายไม่มีกลิ่น มักเสพด้วยการสูดดม หรือรับประทานและสามารถนำมาละลายน้ำดื่มได้



การออกฤทธิ์ และพิษภัย

กระตุ้นประสาทในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นก็มีอาการประสาทหลอนแบบบิดเบี้ยว Psychedelic effects ผิดไปจากความจริง ผู้เสพจะเคลิบเคลิ้มมีอาการสนุกตลกขบขัน กล้ามเนื้อกระตุกที่แขน ขาชาๆ คล้ายเดินโยกย้ายตลอดเวลา ไม่รู้จักเหนื่อย เกิดความผูกพันรักใคร่ไว้วางใจคนรอบข้างอย่างจริงใจ ลึกซึ้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมมั่วเพศในกลุ่มวัยรุ่นที่จัดงานปาร์ตี้ ยาไอซ์ ยาเลิฟ หรือชุมชนเต้นรำอย่างคลั่งไคล้ ในผู้ที่เสพต่อเนื่องทำให้ระบบประสาทหลั่งสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารควบคุมสภาพอารมณ์ลดจำนวนเหลือน้อยลงหรือหมดไป อารมณ์สุขจะลดลง ทำให้ผู้เสพรู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า มีอาการทางจิต มีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตาย

ยาเค ใช้ยาในทางที่ผิด ชีวิตจะอยู่ในอันตราย

ยาเค หรือ เคตามีน (Ketamine) เป็นยาสลบมีชื่อหลายชื่อ เช่น เคตาเวา (Ketava) เคตาเลา (Ketalar) หรือ คาลิปโซ (Calypzo) วัยรุ่นเรียกว่า ยาเค มีลักษณะเป็นผง ผลึกหรือ เป็นน้ำ

เป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา 2521 หมายถึง ยาที่มีอันตรายสูง ปัจจุบันยานี้ไม่ได้ใช้แล้วมักใช้เป็นยาสลบให้กับสัตว์ประเภทลิง



การออกฤทธิ์ และพิษภัย

จากการใช้ยาในทางที่ผิดโดยนำยาที่แพทย์สั่งมาสูบในปริมาณเล็กน้อยทำให้เยื่อหุ้มเซลล์อัมพาตรับรู้ถูกตัดขาดคือ ภายใจไม่สัมพันธ์กันเป็นความรู้สึกที่หาไม่ได้ในชีวิต ล่องลอย เคลิบเคลิ้ม เมื่อพ้นจากภาวะการออกฤทธิ์ยาแล้ว จะมีอาการสับสน หลงลืมเหตุการณ์อื่นๆเมื่อใช้ต่อเนื่องในระยะเวลาานทำให้เกิดอาการทางจิตเห็นภาพหลอนน่ากลัว อาการนี้อาจเกิดได้แม้ไม่ใช้ยาและเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก (Flash Back) ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลให้กลายเป็นคนวิกลจริตได้



ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำหน่ายไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 5 ปี - ตลอดชีวิต ผู้เสพ จำคุก 6 เดือน - 10 ปี ปรับ 5,000 - 100,000 บาท