

อันตรายที่เกิดจาก ที่เกิดจากใช้ยาในทางที่ผิด



ยาแก้ปวด



ยาแก้แพ้/ยานอนหลับ



ยาแก้ไอ

ยารักษาโรค
ที่มักใช้ในทางที่ผิด

การใช้ยาในทางที่ผิด
อันตราย นำไปสู่
การใช้สารเสพติดที่รุนแรง



อันตรายจากยาไม่ว่าจะใช้เดี่ยว
ผสม หรือสลับ

- การใช้ยาเกินขนาด
- ผลข้างเคียงของยา
- การแพ้ยา



ผลกระทบ

ตนเอง สุขภาพเสื่อมโทรม
ครอบครัว เสี่ยงทรัพย์สิน เสี่ยงชื่อเสียง
สังคมและชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชุมชน

อาการ เป็นพิษ ต่อตับ ไต
มึนงง ง่วงซึม หดสติ ชัก
หยุดหายใจ และเสียชีวิต
เฉียบพลัน



พบการลักลอบจำหน่ายยาเพื่อใช้ในทางที่ผิดแจ้ง สายด่วน อย.1556

ยาเขียวเหลือง

ยา ترامาดอล (TRAMADOL)

การนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำไปผสมกับเครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ เช่น น้ำอัดลม หลังจากดื่มเข้าไป
จะทำให้เกิดอาการเคลิ้ม

อันตรายจากยา ترامาดอล พบได้ตั้งแต่ไม่รุนแรง
เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก มือสั่น ใจสั่น
ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ประสาทหลอน

อาจรุนแรงจนถึงเสียชีวิต เช่น ชัก
กอดการหายใจของร่างกาย ซึ่งถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษา
จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด



ร่วมแก้ไขปัญหา

พ่อแม่/ครู

ให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยอันตราย ให้ความ
เอาใจใส่ พุดคุย ด้วยความเข้าใจ สังเกต
พฤติกรรมและคำปรึกษาที่เหมาะสม



เพื่อน สังเกตพฤติกรรม หากสงสัยว่า
เพื่อนอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้แจ้งครู
เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด



ธุรกิจร้านขายยา/เภสัชกร

เฝ้าระวังและไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่
น่าสงสัยว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิด



ขอคำแนะนำช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
สายด่วนการนำบำบัดยาเสพติด สารเสพติด 1165

